WARTNER®

Yeni Nesil

Siğil & Taban Siğili Giderici

Siğilleri & taban siğillerini kökten dondurur

WARTNER® KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN

A. Siğiller & taban siğilleri hakkında

Siğiller insan papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu cilt üzerinde görülen zararsız oluşumlardır.
Farklı siğil türleri bulunmaktadır ancak en sık görülenleri genel siğillerdir. Kan damarlarıyla beslenen iç dokudan oluşan bir kökten meydana gelir ve dış deri dokusunun tabakalarıyla kaplıdır.

Genel siğiller, pürüzlü "karnabaharımsı" yüzey görüntüleriyle ayırt edilir. Daha çok el, diz ve dirseklerde görülür.

Taban siğilleri (Verruca) genel siğillere benzemekle birlikte yalnızca ayak tabanında veya ayak parmaklarının alt kısımlarında görülür. Taban siğilleri genellikle daha yassıdır ve yürümeden kaynaklanan baskı nedeniyle genellikle acı verir. Wartner taban siğillerinin giderilmesi için özel olarak tasarlanmıştır, en uygun hazırlık ve tedavi sonrası şartları sağlayabilmek amacıyla iki ek uygulama adımı içerir.





Siğiller ve taban siğilleri, genel nüfusun yaklaşık %7 ila 10'unda görülür. Daha çok çocuk ve gençlerde görülür. Siğiller son derece bulaşıcıdır ve vücudun savunma sistemi zayıfsa daha fazla sıklıkla oluşur. Siğiller, enfeksiyonun olduğu bölgeyle doğrudan temasla kişiden kişiye veya aynı kişinin vücudunun bir yerinden diğer yerine geçebilir. Siğillerin %50'den fazlası, tedavi edilmeden iki yıl içerisinde kaybolur. Ancak, göze hoş görünmediğinden ve taban siğili durumunda acı verdiğinden çoğu kişi bunları başlangıçta tedavi etmeyi tercih etmektedir.

Geleneksel olarak, siğilleri veya taban siğillerini tedavi etmenin iki ana yöntemi vardır: birincisi, doğrudan siğil veya taban siğili üzerine asit içeren preparatlar uygulanması; ikincisi ise lazer tedavisi, yakma veya kriyoterapi (sıvı nitrojenle dondurma) yoluyla siğilin doktor tarafından cerrahi müdahale ile alınması yöntemidir. Wartner®, kriyoterapiyi baz alan kullanımı kolay, etkili ve hızlı evde tedavi yöntemidir. 7.5mm'den büyük siğil/taban siğilini tedavi etmek istiyorsanız lütfen doktorunuza danışın.

B. Wartner® nasıl etki eder?

Wartner® siğilleri & taban siğillerini doktorlar tarafından kullanılan dondurma yöntemiyle aynı şekilde tedavi eder.

1. Wartner® siğilleri veya taban siğillerini anında kökten dondurur. Uygulama süngerini siğil/taban siğili üzerine bastırdığınızda, deri beyaz renk alabilir ve donma nedeniyle hafif ağrılı bir yanma hissi oluşabilir. Uygulama süngeri çekildikten sonra normal deri rengi geri gelecektir. Ağrılı, yanma hissi çabuk bir şekilde azalacak ve birkaç saat içerisinde tamamen yok olacaktır.
2. Dondurulan bölge, çözüldükten sonra kırmızı renk alabilir. Donma nedeniyle, birkaç gün içerisinde siğilin altında çıplak gözle görülemeyecek bir kabarcık oluşacaktır. Uygulama yapılan siğil/taban siğili, sonraki 10 ila 14 gün içerisinde yavaş yavaş kaybolmalı veya düşmeli ve altından yeni, sağlıklı deri gözükmelidir.

C. Yan etkiler:

- Bütün dondurma yöntemlerinde olduğu gibi, deri geçici olarak beyaz renk alabilir.

- Donmaya aşırı maruz kalma derinin üst tabakalarına hasar verebileceğinden ve yara izlerine ve/veya sinir hasarına yol açabileceğinden ürünün talimatlara harfiyen uyularak kullanılması önemlidir.

- El/ayak parmaklarındaki sağlıklı dokunun (uygulama süngerinin belirtilen süreden fazla süreyle uygulanması nedeniyle oluşabilir) ürüne maruz kalması lokal doku ölümüne yol açabilir.

- Bazı kişilerde, acı veren daha büyük kabarcıklar oluşabilir.

- Siğil döküldükten sonra pigment kaybı ve/veya küçük yara izleri oluşabilir.

- Wartner®in kullanımı, ürünün donma noktası altındaki sıcaklığı nedeniyle hafif şiddetli yanıklara yol açabilir ancak bu türden yan etkiler bildirilmiş olmalarına rağmen göreceli olarak azdır.

- Yan etkilileri en aza indirmek için Wartner®i kullanma talimatlarında belirtildiği gibi kullanmak çok önemlidir (kullanma talimatlarına bakın).

D. Uyarı: Wartner®'i kullanmamanız gereken belirli durumlar:

Deri sorununun, bir siğil veya taban siğili olup olmadığından %100 emin değilseniz, **Wartner®i** kullanmadan önce bir doktora danışın.

Bu ürün yalnızca yetişkinler tarafından uygulanmalıdır. 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayın. Hamileyseniz veya emziriyorsanız ürünü kullanmayın. Cildin donan bölümü aynı oranda hızlı veya tamamen iyileşmeyebileceği için diyabet hastasıysanız ürünü kullanmayın. Kan dolaşımı zayıf olan kişiler, Wartner®i kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Yüz, boyun, koltuk altı, göğüsler, makat çevresi veya genital bölgeler gibi ince veya hassas deri üzerinde kullanmayın. Tahriş olmuş deri veya enfeksiyonlu, kızarmış veya kaşınma veya şişme gibi herhangi bir iltihap belirtisi gösteren deri üzerinde kullanmayın.
Üzerinde kıl çıkan siğiller & taban siğillerinde, doğum lekeleri, koyu renkli benler, pigmente deri veya diğer olağandışı görünen cilt durumlarında kullanmayın.

E. Dikkat edilmesi gereken hususlar

- Deri sorununun taban siğili olup olmadığına dair şüpheleriniz varsa doktorunuza danışın.
- Yalnızca harici kullanıma uygundur: yutmayın veya solumayın, yalnızca iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
- Kullandıktan hemen sonra ellerinizi (tedavi edilen bölge hariç) yıkayın.
- Wartner®i yalnızca verilen özel uygulama süngerleriyle birlikte kullanın.
- Her bir siğil veya taban siğili için tek bir uygulama süngeri kullanın ve her bir uygulama süngerini yalnızca bir kez kullanın.
- Eğer siğil elin üst kısmındaysa, uygulama sırasında parmaklarınızı hafifçe hareket ettirin.
- Uygulama yapılacak siğil/taban siğilinin etrafındaki sağlıklı deri ile temastan kaçınılmalıdır.
- Uygulama süngerini siğil/taban siğili üzerine bastırırken aşırı basınç uygulamayın.
- Ürünü siğil/taban siğilinin etrafındaki alana bastırmayın.
- Uygulama süngeri maksimum 20 saniye (siğil)/ 40 saniye (taban siğili) veya siğil veya taban siğilinin etrafındaki deri beyaz renk alırsa daha az süreyle uygulanmalıdır.
- Özellikle el üzerinde ya da parmaklarda, birbirine yakın birden fazla siğil/ taban siğili varsa, her seferde sadece 1 tanesine tedavi uygulayın. Kalan her bir siğili 2 haftalık ara vererek tedavi edin.
- Olgun ve büyük siğiller & taban siğillerinin giderilmesi zor olabilir ve genellikle Wartner® ile birden fazla uygulamaya ihtiyaç duyulabilir.
- Birden fazla uygulamanın gerekmesi halinde, uygulamayı 2 hafta sonra tekrarlayın. Aynı siğile, toplamda üç kereden fazla uygulama yapmayın. Yapılan üç uygulama ile iyileşme sağlanmamışsa doktorunuza danışın.
- Son kullanma tarihi ve lot numarası ambalaj üzerinde ve aerosol tüpün altında bulunur.
- Wartner® son derece yanıcı bileşenler içermektedir: Bu ürünü iyi havalandırılan bir yerde, ateş, ısı, direkt güneş ışığı, ışık kaynakları da dahil olmak üzere elektrostatik ve elektrik kaynaklarından en az 1m uzakta kullanın. Ürünün yakınında sigara içmeyin veya yanmakta olan sigara bulundurmayın. Ürünü kullanırken 50°C üzerinde sıcaklıklara (örneğin elektrik ışığı) maruz bırakmayın. Metal tüpü, sert bir yüzeye dayayarak kullanmak yerine vücuttan uzakta ve havada, tercihen dik konumda tutulmalıdır.
- Kullanım sonrasında dahi metal tüpü delmeyin veya ateşe atmayın.
- Güvenli bir yerde muhafaza edin. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerde ve ambalajında saklayın.

F. Wartner® kutusunun içindekiler:

- Çevreye zararlı olmayan Dimetil Eter ve Propan karışımı içeren aerosol tüp. CE 0344
- Uygulama süngerlerini uygulamak için 1 adet tekrar kullanılabilir aplikatör tutucu
- 12 uygulamaya kadar kullanılabilen 12 adet tek kullanımlık uygulama süngeri
- 1 adet tekrar kullanılabilir törpü CE
- Wartner®in nasıl etki ettiği, siğil & taban siğili giderme yönteminde doğru bir şekilde nasıl kullanılabileceği ve siğiller hakkında ayrıntılı bilgi içeren okumakta olduğunuz kullanım kılavuzu.

G. Kullanım talimatları

Kullanmadan önce Wartner® kullanma kılavuzunun tamamını okuyun.

Wartner® uygulandıktan 10 ila 14 gün sonra siğiller & taban siğilleri genellikle kaybolur. Olgun veya büyük siğillerde & taban siğillerinde birden fazla uygulamaya ihtiyaç duyulabilir. Eğer siğil/taban siğili veya siğilin bir bölümü 14 gün sonra halen yerindeyse Wartner ile güvenli bir şekilde tekrar uygulama yapabilirsiniz. Uygulama süngerlerinden herbirini tek bir uygulama için kullanın ve daha sonra atın. Wartner® ile yapılan 3 uygulama sonrasında iyileşme sağlanmamışsa doktorunuza danışın.

H. Tedaviden sonra:

- Uygulama yapılmış bölgeyi temiz tutun.
- Yüzebilir ve duş alabilirsiniz.
- Uygulama yapılmış bölgeyle oynamayın veya kaşımayın.
- Kabarcıkları mümkünse flasterle koruyun, kabarcıkları patlatmayın.
- Ağrılı yanma hissi devam ederse veya başka bir komplikasyon baş gösterirse doktorunuza danışın.

SİĞİLLER VE TABAN SİĞİLLERİ İÇİN KULLANIMI KOLAY 4 AŞAMALI UYGULAMA

ADIM 1.

Uygulama süngerinin mavi ucunu başparmağınız ile işaret parmağınız arasında tutun ve küçük bir delik gözükünceye kadar sıkın. Uygulama süngerinin delik kısmını, aplikatör tutucusunun çubuğu üzerine yerleştirin. Bu işlem sonrasında çubuk görülmemelidir.

ADIM 2.

Aerosol tüpü dik bir pozisyonda ve vücudunuzdan veya elektrik kaynaklarından uzakta tutun. Aplikatör tutucusunu, aerosol tüpün tepesindeki deliğe uygulama süngeri görünmeyecek şekilde yerleştirin. Aerosol tüpü, alttan bir elinizle tutarken, aplikatör tutucusunu diğer elinizde **3 saniye** süreyle sıkıca aşağıya doğru bastırın (21'den 23'e kadar sayın). Bastırırken bir tıslama sesi duyacaksınız. Uygulama süngerli aplikatör tutucusunu valften ayırın. Uygulama süngeri artık soğuk sıvıyla doludur ve yoğunlaşma oluşacaktır. Bu yoğunlaşma zararsızdır.



ADIM 3.

Uygulama süngeri yeterli doygunluğa ulaştığında, Wartner'ın daha iyi etki göstermesi açısından ısının istenilen dereceye inmesi için uygulama öncesi 20 saniye bekleyin.

ADIM 4.

20 saniye bekledikten sonra uygulama süngerinin takılı olduğu aplikatör tutucuyu siğilin üzerine hafifçe bastırın.
- Siğiller için: 20 saniye boyunca uygulayın
- Taban siğilleri için: 40 saniye boyunca uygulayın

Siğil ile sürekli temas etmesini sağlayın.
Uygulama süngeri, siğile öngörülen süre boyunca uygulanmalıdır. Donma sonucunda hafif bir ağrılı yanma hissi oluşacaktır.
Siğile uygulama yapıldıktan sonra 2 dakika bekleyin ve bir peçete yardımıyla uygulama süngerini tutucudan çıkartın. Uygulama süngerini tek kullanımdan sonra atın. Cildi, siğil virüsüyle tekrar enfekte etmemek için uygulama süngerini tekrar kullanmayın veya uygulama süngerinin ucuna çıplak elle dokunmayın.

TABAN SİĞİLİ TEDAVİSİNE en iyi şekilde hazırlık ve tedavi sonrası için 2 EK ADIM

TEDAVİ ÖNCESİNDE
İlk olarak ayağı 5 dakika süreyle ılık suda bekletin ve sonra taban siğilini açığa çıkarmak için nasırlaşmış dokuyu (kallus) dikkatlice bir törpü yardımı ile törpüleyin.

ADIM 1-4

Yukarı bakın. Yukarıdaki siğillerin tedavisi ile aynıdır.

ADIM 5

40 saniye uygulama yaptıktan sonra tedavi edilmiş kısmın üzerinde baskı yada sürtünme olduğunda rahatsızlık hissi duyabilirsiniz. Hassas kısmı korumak için rahatlatıcı plaster kullanabilirsiniz. Kutu içerisinde rahatlatıcı plaster yoktur.